

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bi-Soli

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO "Brovafarma", Ucraina, or. Brovarî, bd. Nezavisimosti 18a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Bi-Soli – pulbere pentru uz intern și extern.

În 100 g se conține:

Sulfat de sodiu anhidru (Na_2SO_4) - 90 g

Hidrocarbonat de sodiu (NaHCO_3) - 10 g.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

- În doze mici - pentru toate speciile de animale (bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine, câini, vulpi, vulpi arctice, găini, găște, rațe) pentru stimularea digestiei. În tratamentele complexe ale bolilor infecțioase, parazitare, complicațiilor post-partum, gastritei hiperacidice, acidozei rumenului, hepatitei cronice, distrofiei ficatului, etc.

- În doze mari - ca laxativ (pentru hipotonia și atonia prestomacelor, spasm intestinal, indigestii prin supraîncărcare); pentru evacuarea toxinelor sau substraturilor otrăvitoare din tractul gastrointestinal; în cazurile de inflamații exudative.
- Sub formă de soluții de 1-2% - pentru sifonarea prestomacelor (rumegătoare) sau stomacului (cabaline, canide), folosind sondă specială sau pentru clisme evacuatorii.
- Sub formă de soluții hipertotonice - pentru tratamentul plăgilor.

4. CONTRAINDICAȚII

Hemoragii interne, disfuncții renale, ocluzie intestinală.

5. REACȚII ADVERSE

Date lipsesc.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine, câini, vulpi, vulpi arctice, găini, găște, rațe.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

În calitate de laxativ, se folosesc soluții de 3 - 8%. La animalele de talie mare, se administrează sub formă de breuvaje; canidelor, în amestec cu apa de băut sau în nutreț lichid.

Pentru îmbunătățirea digestiei, doza indicată se administrează zilnic în amestec cu nutreț sau apă, timp de 10-20 zile.

Specia animalului	Dozaj (g/10kg greutate corp)	
	Îmbunătățirea digestiei	laxativ
Bovine	0,7 – 0,8	8 – 9
Ovine	0,9 – 1	10
Cabaline	0,4 – 0,5	5 – 6
Porcine	0,2 – 0,3	2,5 – 3
Câini, vulpi	0,2	3 – 4
Găini	1 – 1,2	10 – 12
Găște, rațe	0,9 – 1	9 – 10

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

- În timpul lucrului cu Bi-solie, este necesar să se respecte regulile comune de igienă personală și tehnicile de securitate prevăzute în utilizarea medicamentelor de uz veterinar.
- Persoanele hipersensibile la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Bi-soli.
- În caz de contact accidental cu pielea sau mucoasele ochilor, se va spăla din abundență cu apă. Dacă apar reacții alergice sau în caz de ingestie, este important să se adreseze imediat unei instituții medicale (având cu sine eticheta sau prospectul medicamentului).
- În timpul lucrului, este interzis fumatul și consumul de alimente sau băuturi. După încheierea lucrului, mâinile se vor spăla cu apă și săpun.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiuni:

- Dozele laxative pot scădea absorbția altor medicamente administrate pe cale orală.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

5 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

- Pungi din hârtie laminată de câte 50 g și 100 g.
- Containere din plastic de câte 100 g și 250 g.

- Pachete din polietilenă de câte 0.4 kg, 1 kg, 5 kg și 10 kg.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru