

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Alben pastile

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO „AVZ S-P”, Rusia, 141305, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1

Tel/fax: (495) 721-49-81

E-mail: nauka@vetmag.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Alben pastile – pastile perorale.

În 1 pastilă conține:

- **Substanță activă:** Albendazol – 360 mg
- **Adjuvanți:** Polivinilpirolidon, stearat de calciu, amidon din cartofi, lactoză.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

ALBEN pastile se indică pentru dehelmintizarea bovinelor, ovinelor, caprinelor în următoarele cazuri:

- **Nematodoze gastrointestinale:**

- Hemonhoză, bunostomoză, esofagostomoză, nematodiroză, ostertagioză, habertioză, cooperioză, strongiloidoză, trichostrongiloză, hiostrongiloză, parascaridoză, ascaridoză, toxocaroză, toxascarioză, anchilostomoză, uncinarioză

- **Nematodoze pulmonare:**

- Dictiocauloză, protostrongilidoză, miulerioză, neostrongiloză, cistocauloză, metastrongiloză

- **Cestodoze:**

- Moniezioză, avitelioză, tizaniezioză

- **Trematodoze:**

- Fascioloză, dicrocelioză, paramfistomatide.

4. CONTRAINDICAȚII

Administrarea preparatului ALBEN pastile este contraindicată în următoarele cazuri:

- Sensibilitate individuală sporită a animalului la componentele preparatului.
- Animale bolnave de boli infecțioase sau slăbite.
- În timpul monei.
- Oilor, caprelor în prima jumătate a gestației.
- Vacilor în primul trimestru al gestației.

5. REACȚII ADVERSE

Conform instrucțiunilor, reacții adverse și complicații în urma administrării preparatului ALBEN pastile nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită la derivatele grupei benzimidazolului și apariția reacțiilor alergice, administrarea se întrerupe și se recomandă administrarea de preparate antihistaminice și tratament simptomatic.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, caprine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

ALBEN pastile se administrează animalelor peroral (intern), forțat, pe rădăcina limbii, în dozele indicate în tabel, în funcție de masa corporală.

Specia animalului	Doza (past/kg masă corp, 1 dată)
Bovine Doză în fascioloză, dicrocelioză, paramfistomidoză și ostertagioză	1 pastilă/50 kg 1 pastilă/35 kg
Ovine, caprine Doză în fascioloză, dicrocelioză și protostrongilidoze	1 pastilă/70 kg 1 pastilă/45 kg

Dehelmintizarea animalelor cu scop curativ se efectuează la indicații, cu scop profilactic – primăvara înainte de pășunat și toamna înainte de perioada de stabulație.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

- Sacrificarea animalelor pentru consum uman este permisă la 20 de zile de la ultima administrare. Carcasele obținute înainte de expirarea acestui termen se pot utiliza în hrana carnivorelor.

- Laptele obținut nu poate fi folosit pentru consum uman timp de 7 zile după dehelmintizare; după prelucrare termică, poate fi utilizat în hrana animalelor carnivore.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Dieta specială sau administrarea laxativelor în prealabil nu sunt necesare.

Înainte de dehelmintizarea în masă, fiecare serie a preparatului trebuie testată în prealabil pe un grup mic de animale (5-10 capete). Dacă nu apar complicații timp de 3 zile, se poate proceda la dehelmintizarea întregului efectiv.

În caz de supradozare, animalul poate manifesta anorexie, dereglări ale motilității tractului gastrointestinal și apatie. În astfel de cazuri, se iau măsuri pentru evacuarea rapidă a preparatului din organism și se indică tratament simptomatic.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Preparatul se produce în:

- Blistere cu 25 de pastile, fabricate din folie de polimer și foaie de staniol;
- Borcane cu capac din polimer.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru