

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Fluniject

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO "Apicenna", Reg. Moscova, or. Balașiha, ș. Poltevscoe 4

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Fluniject – soluție injectabilă.

Fiecare ml de Fluniject injectabil conține: flunixin meglumin - 83 mg (echivalent cu 50 mg de flunixin) și, ca substanțe adjuvante, salicilat de sodiu - 8 mg, hidroxid de sodiu - 40 mg, alcool benzilic - 10 mg, și apă pentru injecții până la 1 ml.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Fluniject este administrat la bovine, cai, porci și câini ca un antiinflamator, analgezic și antipiretic în tratamentul complex al bolilor respiratorii, oftalmologice, afecțiunilor obstetricale și ginecologice, bolilor aparatului locomotor și altor patologii care implică inflamații acute, sindroame dureroase și hipertermie de diferite etiologii.

4. CONTRAINDICAȚII

Contraindicațiile pentru administrarea preparatului la animale sunt hipersensibilitatea la medicament, ulcerul gastric și duodenal, sindromul hemoragic, insuficiența renală acută, hepatică sau cardiacă, hipovolemia (cu excepția endotoxemiei sau a șocului septic). Preparatul nu ar trebui să fie folosit femelelor gestante, tineretului sub vârsta de 1,5 luni, precum și purceilor cu masa corporală mai mică de 6 kg. Se interzice administrarea preparatului intraaortal și administrarea acestuia la pisici.

5. REACȚII ADVERSE

În caz de supradozare la animale poate apărea anorexie, salivă și apatie.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, cabaline, porcine, câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Fluniject se aplică animalelor parenteral, o dată pe zi, după cum urmează:

- **Vitei** (pentru boli respiratorii, ginecologice și alte patologii însoțite de procese inflamatorii): intravenos sau intramuscular, 2 ml la 45 kg de masă corporală (2,2 mg/kg flunixin) până la ameliorarea stării clinice a animalului, dar nu mai mult de 5 administrări succesive.
- **Porcine** (pentru boli respiratorii, ginecologice, sindromul MMA): profund intramuscular în latura gâtului, 2 ml la 45 kg de masă corporală (2,2 mg/kg flunixin), cu rapel la 24 de ore, dacă este necesar.
- **Câini** (pentru blocarea inflamațiilor și atenuarea durerii în tratamentul bolilor sistemului locomotor, ca antipiretic): intravenos sau intramuscular, 0,2 ml/10 kg masă corporală (1 mg/kg flunixin) până la ameliorarea stării generale, dar nu mai mult de 3 administrări consecutive.
- **Cabaline:**
 - Pentru bolile aparatului locomotor: intravenos, 1 ml la 45 kg masă corporală (1,1 mg/kg flunixin) o dată pe zi, până la ameliorarea stării clinice, dar nu mai mult de 5 administrări consecutive.

- Pentru atenuarea durerii viscerale asociate cu colici: 1 ml la 45 kg de greutate corporală (1,1 mg/kg flunixin), cu rapel la necesitate după 24 de ore.
- În caz de endotoxemie, șoc septic și alte boli asociate cu tulburări circulatorii în tractul gastro-intestinal, dar și ca agent antipiretic în cazul infecțiilor bacteriene și virale, în urma intervențiilor chirurgicale: 0,2 ml la 45 kg masă corporală (0,22 mg/kg flunixin) la fiecare 6-8 ore până la ameliorarea stării clinice, dar nu mai mult de 3 administrări consecutive.

În evitarea posibilei senzații de durere, nu se administrează mai mult de 5 ml animalelor mari și mai mult de 2,5 ml animalelor mici într-un singur punct.

În caz de **supradozaj**, pot apărea simptome de boli renale, hemoragii gastro-intestinale, vomă, acidoză și indicii crescuți ale transaminazelor. În acest caz, se administrează preparate de detoxifiere și terapie simptomatică.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Sacrificarea animalelor pentru consum uman de la ultima administrare se permite după următoarele perioade:

- Porcine – 28 zile
- Cabaline – 8 zile
- Bovine:
 - Administrare intravenoasă – 8 zile
 - Administrare intramusculară – 35 zile

Laptele vitelor mulgătoare poate fi utilizat în scopuri alimentare nu mai devreme de 60 de ore de la ultima utilizare. Laptele obținut înainte de acest termen, prelucrat termic, poate fi utilizat în hrana animalelor.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Preparatul se păstrează în recipientul închis al producătorului, în loc întunecat, uscat, departe de alimente și furaje pentru animale, la o temperatură între +5 °C și +25 °C. În timpul păstrării, este posibilă apariția sedimentului, care dispare la agitare a flaconului.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu se recomandă administrarea Fluniject în asociere cu alte preparate anti-inflamatorii și remedii cu efect nefrototoxic. Cu precauție, sub supravegherea medicului veterinar, preparatul Fluniject se administrează concomitent cu preparate de anestezie generală, anticoagulante și sulfonamide.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii, de la prima deschidere – 28 zile.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Fluniject se produce în flacoane din sticlă de 10, 20, 50, 100, 200, 250 și 500 ml, închise ermetic cu dopuri de cauciuc și capace din aluminiu. Flacoanele sunt ambalate în cutii de carton, împreună cu instrucțiuni de utilizare.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru