PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

ASD 3F

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Deținătorul certificatului de înregistrare:
OOO "NVȚ Agrovetzașcita", 129329, Rusia, or. Moscova, tr. Igarskii 4/2
Producător responsabil pentru eliberarea seriei:
OOO NVȚ „Agrovezașcita S-P", 141300, Rusia, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

ASD 3F (ASD fracția 3) – soluție.
ASD fracția 3 conține un complex cu un conținut de cel puțin 90% de substanțe biologic active.

Substanțe active:
Acizi carboxilici, hidrocarburi alifatice și ciclice, alchilbenzeni, fenoli substituiți, derivați alchili ai pirolului, amine și amide alifatice, precum și compuși cu o grupare sulfhidril activă.

Excipienți: apă.
Soluție pentru uz extern.
Soluție densă de culoare maro închis până la negru, cu miros caracteristic, solubilă în alcool, uleiuri vegetale și animale și practic insolubilă în apă.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

ASD fracția 3 se indică animalelor în tratamentul plăgilor infectate atone (perioada de vindecare îndelungată), dermatitelor, proceselor infecțioase cronice ale pielii și copitelor, ulcerelor trofice, în caz de fistule, pododermatită infecțioasă a ovinelor și necrobecterioză.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţele active.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform prospectului dat, reacții adverse sau complicații nu apar. În caz de sensibilitate sporită sau apariția reacțiilor alergice, administrarea se stopează și se recurge la terapie simptomatică cu antihistaminice.
Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să informați medicul veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, cabaline, porcine, câini şi păsări de curte.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

ASD-3F se indică animalelor extern nediluat sau în formă de soluții uleioase de 25-50%.

Soluțiile uleioase se prepară în condiții aseptice folosind uleiuri sterile de ricin, in, floarea soarelui sau untură de pește, în care se adaugă ASD-3F steril, minuțios amestecând, în raport de 1:4 sau 1:1.

În tratamentul plăgilor infectate atone și al fistulelor, porțiunea afectată se spală cu soluție de 15-20% de ASD-2F până la încetarea eliminării exudatului purulent și apoi se aplică pansament (3 straturi) îmbibat cu soluție uleioasă de 25% de ASD-3F, care se fixează cu un bandaj. Pansamentul se schimbă zilnic, până la însănătoșire.

În cazul eczemelor, escarelor, dermatitelor, proceselor inflamatorii cronice ale pielii, piodermiilor și ulcerelor trofice, pe suprafața afectată și 2-3 cm din țesutul limitrof se aplică soluție uleioasă de ASD-3F de 25-50%, o dată pe zi. Cura de tratament durează până la însănătoșire, dar nu mai mult de 21 de zile.

În cazul afecțiunilor extinse ale pielii, soluție de 50% se aplică în mod alternativ pe diferite zone, acoperind într-un tratament nu mai mult de 10% din suprafața corpului animalului.

Pododermatita infecțioasă a ovinelor și necrobacterioza presupun curățarea suprafețelor afectate, după care se aplică ASD-3F ca atare (nediluat), o dată pe zi. Se recurge la tratament complex în asociere cu terapia specifică și simptomatică până la dispariția simptomelor, dar nu mai mult de 28 de zile.

Recomandări privind administrarea corectă:
Se recomandă respectarea concentrațiilor și intervalelor de administrare pentru a nu diminua din eficiența medicamentului. În caz de omitere a unui dozaj, administrarea se reia cât de repede posibil, în aceeași doză, conform aceleași scheme.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Came, organe, lapte, ouă: O zile.
În caz de sacrificare, porţiunile carcasei tratate cu ASD-3F se curăţă şi se elimină.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original, separat de alimente și nutrețuri, protejat de lumina solară directă, la temperatura de la +4°C până la +35°C, într-un loc inaccesibil copiilor.
Perioada de valabilitate după prima deschidere: 30 zile.
A nu se utiliza acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglamentările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:
Tineretului să i se administreze sub controlul medicului veterinar în urma evaluării raportului risc-beneficiu.

Precauții speciale pentru utilizarea la animale:
Particularitățile deosebite ale acțiunii medicamentului la prima administrare sau în caz de anulare nu au fost stabilite. Se recomandă respectarea dozajului indicat și a modului de administrare pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reia în aceeași doză, conform aceleași scheme.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul la animale:
Este important de respectat regulile comune de igienă personală și tehnica de siguranță prevăzute în lucrul cu medicamente de uz veterinar.
Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului de uz veterinar li se recomandă evitarea contactului direct cu ASD-3F.

În caz de contact accidental cu pielea sau mucoasele oftalmice, acestea se spală din abundență cu apă.
În caz de apariție a reacției alergice sau la ingerare, este important să se adreseze unei instituții medicale cât mai repede posibil (având eticheta sau prospectul la îndemână).

În timpul lucrului se interzice fumatul, consumul de alimente și băuturi. La finalizarea lucrului, mâinile se spală cu săpun.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație:
Femelelor gestante, în lactație, precum și descendenților acestora li se va administra sub controlul medicului veterinar, în urma evaluării raportului risc-beneficiu.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:
Nu se cunosc.

Supradozare:
Nu au fost înregistrate cazuri.

Incompatibilități:
În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii, de la prima deschidere – 30 zile.
A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Ambalaj primar: flacon din sticlă de 50 ml și 100 ml de medicament, cu dop din cauciuc și capac din aluminiu.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Cameniţa 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru