

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

DELTOX

Soluție pentru uz extern

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

PrAT "VNP" Ucrzoovetprompostaci", Ucraina, 03040, Kiev, str. Vasilikivsika 16

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Deltox - soluție pentru uz extern. Preparatul conține în calitate de substanță activă: deltametrin 5 g/100 ml și excipienți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Tratamentul și profilaxia bovinelor și ovinelor în caz de infestare cu ectoparaziți (căpușe ixode și sarcoptice, păduchi malofagi și hematofagi, insecte zburătoare).

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită. A nu se prelucra animalele bolnave, epuizate și cu vârsta sub 2 luni.

5. REACȚII ADVERSE

La administrare conform instrucțiunilor, reacții adverse și complicații nu apar.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Deltox este un medicament de uz extern, pentru încăperi și animale. Soluția se prepară înainte de folosire, prin adăugarea de Deltox (conform dozajului) într-o cantitate mică de apă, se omogenizează și se aduce volumul necesar de apă în rezervorul pompei sau a băii. Animalele se prelucrează prin aspersare sau îmbăie. Succesiunea aspersării: pavilionul urechii, capul, corpul, coada, regiunea în jurul orificiului anal și membrele. O atenție deosebită o necesită zonele afectate. A nu se spăla soluția de pe suprafața corpului animal. Nu se recomandă aspersarea împotriva vântului.

Cantitatea de preparat Deltox la 1000 litri apă:

Boala	Dozaj		Modul de prelucrare și numărul lor
Psoroptoză, Sarcoptoză	Profilaxie 0,6 L	Tratament 1,0 L	Îmbăiere, aspersări. De 2 ori cu interval de 10-12 zile
Sifunculatoză, melofagoză	0,25 L		Ovine-îmbăiere; Bovine -aspersare. 1 dată.
Arahoentomoze	0,5 L		Aspersarea preventivă-1 dată, curativă-repetare peste 7-10 zile.

Încazul sarcoptozelor , ovinelor se efectuează la 6-8 zi după tunderea lor.

Volumul necesar de soluție pentru prelucrarea unui animal.

Bovine – 0,5-1 L;

Ovine – 0,2-0,5 L;

Animalele se prelucrează pe teritorii special amenajate sau în camere speciale. A se evita contactul sau nimerirea soluției în ochi, nas sau gura animalului.

Prelucrarea adăposturilor animaliere:

Deltox se folosește pentru prelucrarea adăposturilor animalelor în prezența animalelor, inclusiv a tineretului. Se indică contra tuturor insectelor zburătoare și târâtoare, inclusiv gândacilor de bucătărie, dăunătorilor de depozit, furnicilor, ploșnițelor ș.a. Dezinsecția și dezacarizarea încăperilor se efectuează prin pulverizare cu pompă de presiune înaltă. Volumul necesar de soluție pentru prelucrarea 1m² diferă în dependență de tipul suprafeței prelucrate (beton, piatră, lemn, masă plastică, ș.a.) și de specia de insecte.

Specia insectelor	Suprafață absorbantă	Suprafață non- absorbantă
Insecte târâtoare Deltox Consum la 100 m ²	30 ml/10 litri apă 10 litri de soluție	30 ml/10 litri apă 5 litri de soluție
Insecte zburătoare Deltox Consum la 100 m ²	15 ml/10 litri apă 10 litri de soluție	15 ml/10 litri apă 5 litri de soluție

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Sacrificarea animalelor pentru consum uman se permite peste 5 zile după ultima prelucrare.

Laptele se da în consum peste 3 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, evitând apropierea de surse de căldură sau foc deschis, inaccesibil persoanelor străine și animalelor, separat de produse alimentare și furaje, la T°0 +35°C.

Preparatul Deltox este inflamabil, T°C de autoinflamare +38°C. La ardere elimină gaze toxice.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

În caz de scurgere e important de localizat scurgerea îngrădind locul și presurând un strat de pulbere (nisip, ciment, var) pentru absorbție; se colectează tot stratul solid într-un vas potrivit pentru colectarea și nimicirea lui.

Ambalajele deșarte se decontaminează prin umplere pe timp 5-6 ore cu soluție de 3-5% de sodă calcinată, după care se spală cu apă. Resturile de preparat se inactivează cu soluție de 5% de NaOH , cu suspensie de var stins sau clorură de var (1:3). Resturile inactivate, apele reziduale de la spălatul ambalajelor se îngroapă la adâncimea nu mai mică de 0,5 m, în groapă săpată la distanța de 50m și mai mult de oricare sursă de apă sau loc de pășunat. Medicamentul poate fi neutralizat sau nimicir prin ardere în unități speciale. Se interzice folosirea repetată a ambalajelor.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

A se folosi cu precauție la animalele gestante, a evita supradozarea. Folosirea concomitentă a preparatului Deltax și compușilor organofosforici scade viteza bio transformării lui și sporește toxicitatea. Preparat toxic pentru albini și pești!
Acționează fitotoxic față de crizanteme, orchidei și trandafiri.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii. A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Fiole din sticlă a câte 2 și 5 ml, flacon din sticlă a câte 100 ml, butelie din sticlă sau metal a câte 1000 ml.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru