

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Rodotium 45%

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
AO"Biovet", 4550 Bulgaria, or. Peștera, str. Piotr Rakov

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA
Rodotium 45% - denumirea internațională nepatentată – tiamulină. Preparatul se prezintă sub formă de granule pentru administrare orală, fiecare gram conținând ca **substanță activă** tiamulină în formă de hidrogen fumarat – 450 mg, alături de adjuvanți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Rodotium 45% se indică cu scop curativ porcinelor în cazul bolilor respiratorii și ale tractului gastrointestinal de etiologie bacteriană, agenții cauzatori ai căror sunt sensibili la tiamulină, precum și în cazul artritelor provocate de micoplasme. De

asemenea, se utilizează pentru curcani și găini în caz de micoplasmoze provocate de *M. gallisepticum*, *M. synoviae* și *M. meleagridis*.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită la componentele preparatului. A nu se administra animalelor cu insuficiență renală sau hepatică și scroafelor în prima lună de gestație. Este contraindicată administrarea concomitentă cu monensina, salinomicina, narazina și alte coccidiostatice ionofore, precum și cu antibiotice aminoglicozide, timp de 7 zile înainte și 7 zile după administrarea acestor medicamente, pentru a evita reacțiile adverse și complicațiile.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii, reacțiile adverse și complicațiile nu apar. În caz că nu s-a respectat intervalul dintre administrări cu medicamentele coccidiostatice ionofore sau antibiotice aminoglicozide, pot apărea diaree, anorexie, pareze, efecte nefrotoxice etc. În cazul apariției unei reacții alergice, administrarea se oprește, iar tratamentul include antihistaminice și tratament simptomatic.

6. SPECII ȚINTĂ

Porcine, păsări.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Rodotium 45% se administrează cu apa de băut, fie individual, fie în grup. La administrarea în grup, soluția trebuie pregătită zilnic și este important să fie unica sursă de apă pentru porci și păsări.

- Pentru porcine în caz de dizenterie, Rodotium 45% se administrează timp de 3-5 zile, în doză de 0,02 g/1 kg greutate corporală, ceea ce corespunde la 9,0 mg tiamulină/1 kg greutate corporală. Necesarul zilnic de apă prevede consumul soluției de 0,006% tiamulină.

- În tratamentul pneumoniei enzootice, Rodotium 45% se administrează porcinelor timp de 5-10 zile, în doză de 0,033-0,045 g (15-20 mg tiamulină)/1 kg greutate corporală. Consumul dozei zilnice de medicament se face cu soluția apoasă de 0,012-0,018% tiamulină.

- În tratamentul pleuropneumoniei porcine, Rodotium 45% se folosește timp de 5-7 zile în doză de 0,045 g (20 mg tiamulină)/1 kg greutate corporală, cu soluție apoasă de 0,018% tiamulină.

Prepararea soluțiilor:

- Pentru soluție de 0,006%, 1 g de Rodotium 45% se diluează în 7,5 l de apă.
- Pentru soluție de 0,012%, 1 g se diluează în 3,75 l de apă.
- Pentru soluție de 0,018%, 1 g se diluează în 2,5 l de apă.

Pentru păsări:

- Consumul necesar de tiamulină pentru păsări se asigură cu soluția apoasă de 0,025% tiamulină, pentru obținerea căreia 1,1 g se diluează în 2 l apă.
- Pentru curcani, în scop curativ al infecțiilor cu micoplasma, Rodotium 45% se administrează timp de 3-5 zile, în doză de 0,056-0,11 g/1 kg greutate corporală, ceea ce corespunde la 25-50 mg tiamulină/1 kg greutate corporală.
- Pentru puii broiler, în scop curativ în cazul micoplasmozelor în primele zile de viață, Rodotium 45% se administrează în doză de 0,28 g/1 kg greutate corporală, ceea ce corespunde la 125 mg tiamulină/1 kg greutate corporală, timp de 3 zile; din ziua a 28-a de viață, se administrează în doză de 0,067 g/1 kg greutate corporală, ceea ce corespunde la 30 mg tiamulină/1 kg greutate corporală, timp de 5 zile.
- Pentru tineretul de înlocuire, Rodotium 45% se administrează timp de 2-3 zile, în doză de 0,067 g/1 kg greutate corporală, ceea ce corespunde la 30 mg tiamulină/1 kg greutate corporală.
- Pentru găini de reproducere, Rodotium 45% se administrează timp de 3 zile în doză de 0,056 g/1 kg greutate corporală, ceea ce corespunde la 25 mg tiamulină/1 kg greutate corporală.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Termenele de așteptare pentru consumul produselor de origine animală după administrarea Rodotium 45% sunt:

- Carne porcine: 2-4 zile
- Carne de găină: 2 zile
- Carne de curcan: 6 zile
- Ouă: 0 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care ar putea să-l folosească greșit.

Administrarea Rodotium 45% scroafelor gestante și în lactație se face doar sub supravegherea medicului veterinar și numai dacă beneficiul depășește riscul pentru fetus.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii, de la prima deschidere – 3 luni.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Rodotium 45% este disponibil în următoarele ambalaje:

- 100 g și 1000 g în borcane din polipropilenă sau pachete din folie de aluminiu.
- 10 kg în pungi de polietilenă, închise în saci de hârtie.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru