

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Cetîre s hvosticom

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO "AVZ S-P", Rusia, 141305, reg. Moscova, or. Sergheev Posad, str. Țentralinaia 1.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA
Cetîre s hvosticom – comprimate pentru reglarea comportamentului sexual la câini și pisici.

Conțin în calitate de **substanță activă** megestrol acetat – 5 mg/past și **adjuvanți**: manitol, lecitină, xilit, lactoză, amidon, plasdon S-630, stearat de calciu, aerosil și adaos gustativ.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Cetire s hvostikom pastile se indică cu scop contraceptiv și pentru reglarea excitării sexuale: cățelelor și pisicilor – pentru reținerea și întreruperea căldurilor, eliminarea

simptomelor de gestație falsă și lactație, câinilor și motanilor – pentru diminuarea libidoului și corectarea comportamentului.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitatea înaltă a animalului la componentele preparatului (inclusiv în anamneză), boli ale tractului urogenital, tumori, diabet zaharat, dereglări hormonale. Nu se recomandă administrarea preparatului animalelor imature, cățelelor și pisicilor începând cu ziua a 3-a a căldurilor, în timpul gestației și lactației.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii date complicații și reacții adverse nu apar.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Cetîre s hvostikom pastile se administrează animalelor individual, peroral (intern) pe rădăcina limbii sau cu o cantitate mică de deliciu, cu 1-2 ore înainte de hrănire, ținând cont de specia și sexul animalului.

Pisicilor pentru întreruperea căldurilor la apariția primelor simptome, dar nu mai târziu de a 3-a zi a căldurilor, se administrează câte 1 pastilă (5 mg megestrol acetat/animal) pe zi, timp de 8 zile. Pe parcursul unui an nu se recomandă mai mult de două cure. În caz de dificultăți în determinarea începutului căldurilor, se recomandă reținerea acestora, decât întreruperea.

Pisicilor pentru reținerea căldurilor, se administrează în perioada de anestrus (între călduri) câte 1 pastilă, o dată la 2 săptămâni, dar nu mai mult de 18 luni. Înainte de o cură nouă, se recomandă o perioadă de repaus de 2 luni. Repetarea curei poate fi efectuată atunci când funcția reproductivă își revine la normal.

Cățelelor pentru prevenirea căldurilor se administrează cu 7-15 zile înainte de începutul căldurilor, în doză de 1 pastilă/10 kg masă corporală (0,5 mg megestrol acetat/kg), zilnic. Durata curei depinde de termenul de reținere a căldurilor, dar nu trebuie să depășească 32 de zile. Căldurile la cățea se pot începe după câteva zile de la excluderea preparatului. Administrarea pe termen lung (o lună) poate determina începerea căldurilor după 4-6, uneori 2-9 luni.

Dozele zilnice ale preparatului Cetîre s hvostikom pastile pentru prevenirea căldurilor la cățele, în funcție de masa corporală a animalului, sunt prezentate în tabelul 1.

Masa animalului, kg	Doze zilnice de preparat pentru reținerea căldurilor la cățele	
	Megestrol acetat, mg	pastile
Până la 5	2,5	0,5
6 – 10	5	1
11 – 15	7,5	1,5
16 – 20	10	2
21 – 30	15	3
31 – 40	20	4
41 – 50	25	5
51 – 60	30	6

Cățelelor pentru întreruperea căldurilor, preparatul se administrează la apariția primelor simptome, dar nu mai târziu de 3 zile de la începutul acestora, în doză de 2 mg megestrol acetat/1 kg masă corporală. Dozele zilnice de preparat pentru întreruperea căldurilor la cățea, în funcție de masa corporală a animalului, sunt prezentate în tabelul 2. În primele 3 zile se administrează doza zilnică întregă, iar apoi, timp de 7 zile, se administrează 1/2 din doza zilnică. Pe parcursul unui an, nu se recomandă mai mult de două cure de administrare a preparatului. În urma administrării, căldurile încep peste 4-6, uneori 2-9 luni.

Masa animalului, kg	Doze zilnice de preparat pentru întreruperea căldurilor la cățele	
	Megestrol acetat, mg	pastile
Până la 5	10	2
6 – 10	20	4
11 – 15	30	6
16 – 20	40	8
21 – 30	60	12
31 – 40	80	16
41 – 50	100	20
51 – 60	120	24

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Se recomandă evitarea omiterii unui dozaj, deoarece acest lucru poate duce la diminuarea eficienței. În caz de omitere, administrarea se reia în aceeași doză, conform aceleiași scheme.

Nu se recomandă administrarea preparatului Cetîre s hvostikom pastile pe termen lung concomitent cu corticosteroizi. Informațiile despre incompatibilitatea preparatului cu preparate din alte grupe farmacologice, adaosuri furajere și furaje lipsesc.

Preparatul Cetîre s hvostikom pastile nu este destinat pentru animale productive.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Se prezintă preparatul ambalat câte 10 pastile în blistere din peliculă polimerică și foaie de staniol, ambalaj secundar, cutie din carton câte 1 sau 2 blistere și instrucțiune.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru