

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

FLORON

soluție orală

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1.DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
KRKA, Slovenia, Novo mesto.

2.DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

100 ml soluție orală conțin 10 g fluorfenicol.

Fluorfenicolul este un antibiotic de sinteză cu spectru larg care inhibă sinteza proteică în celula bacteriană. În protoplasmă fluorfenicolul se leagă de subunitatea ribozomală 70S perturbând activitatea enzimei peptidiltransferază ceea ce duce la inhibarea sintezei proteice din ribozomii bacteriilor susceptibile.

Fluorfenicolul este un derivat de tiamfenicol. În structura sa gruparea hidroxil este substituită cu un atom de fluor ceea ce conferă rezistență împotriva acetil-transferazelor bacteriene. Este activ și împotriva bacteriilor rezistente la cloramfenicol.

Fluorfenicolul are un efect bacteriostatic împotriva unei game largi de bacterii Gram-pozitive și Gram-negative cum ar fi: *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Salmonella spp*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp*, *Proteus spp*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Shigella spp*, *Klebsiella spp*, *Enterobacter spp* și altele.

După administrare orală fluorfenicolul este rapid absorbit și bine distribuit în organism. Concentrații ridicate de substanță activă se ating în plămâni rinichi și bilă. Se realizează de asemenea concentrații semnificative în mușchi tractul intestinal inimă ficat splină și ser sanguin. Fluorfenicolul suferă un proces de biotransformare parțială aproximativ jumătate din doza administrată fiind eliminată din organism în formă nemodificată.

3.INDICAȚII TERAPEUTICE

Găini – infecții colibacilare, infecții produse de *Pasteurella*, coriză infecțioasă, infecții stafilococice, infecții produse de *Ornithobacterium rhinotracheale* și alte afecțiuni cauzate de microorganisme sensibile la fluorfenicol. Nu se administrează în perioada de ouat dacă ouăle sunt destinate consumului uman.

Suine – pleuropneumonie (*Actinobacillus pleuropneumoniae*), rinită atrofică (*Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*), boala Glasser (*Haemophilus parasuis*) și alte afecțiuni cauzate de microorganisme sensibile la fluorfenicol.

4. CONTRAINDICAȚII

Contraindicația pentru utilizare este sensibilitatea individuală crescută a animalului la componentele medicamentului. Este interzisă utilizarea Floron 10% pentru tratarea scroafelor în perioada de gestație și lactație, precum și a țarcărilor producători.

5.REACȚII ADVERSE

La găini nu s-au înregistrat reacții adverse.

Ocazional, după administrare la porc, se poate înregistra congestie a regiunii perianale și apariția materiilor fecale moi. Aceste manifestări sunt tranzitorii, de scurtă durată și nu au efect asupra stării generale a animalului.

6.SPECII ȚINTĂ

Porcine și găini.

7.POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Găini – doza zilnică este de 20 mg/kg greutate corporală, echivalentul a 100 ml produs pentru 100 litri apă de băut pentru păsările cu vârsta de până la 4.

săptămâni, respectiv 200 ml produs pentru 100 litri apă de băut pentru păsările mai mari de 4 săptămâni. Durata tratamentului este de 3-5 zile. Nu se administrează în perioada de ouat dacă ouăle sunt destinate consumului uman. Suine – doza zilnică este de 1,5-2 mg fluorfenicol/kg greutate corporală. Pentru un porc de 100 kg aceasta reprezintă 1,5-2 ml produs pe zi Durata tratamentului este de 7 zile.

La găini și porcine medicamentul se administrează în apa de băut. Pe perioada tratamentului animalele vor primi exclusiv apă de băut medicamentată. Dacă acest lucru nu este posibil doza zilnică se va diviza în 2 doze egale administrate la un interval de 12 ore.

8.PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne și organe de găină – 2 zile.

Carne și organe de porc – 1 zi.

9.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În ambalaj original, la o temperatură de maximum +25°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Nu sunt.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

Este indicat pe ambalaj.

13.STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane de 100 ml sau canistre de 1 litru, din plastic, cu dozator.

15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru