

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Express Tabs

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Producător: SRL "AVZ SP", Rusia, 141305, Regiunea Moscova, r-l Serghiev-Posadsky, or. Serghiev Posad, str. Centrală, ap. I/11

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA
1 pastilă de preparat conține:

Pentru câini cu greutatea 5 kg - spinosad -150 mg, moxidectină -1 mg; praziquantel -25 mg;

Pentru câini cu greutatea 10 kg - spinosad -300 mg, moxidectină -2 mg; praziquantel -50 mg

Pentru câini cu greutatea 30 kg - spinosad -900 mg, moxidectină -6 mg; praziquantel -150 mg.

Excipienți: lactoză, aditiv aromatizant „aromă de carne”, amidon de porumb pregelatinizat și stearat de calciu.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Express Tabs este prescris câinilor adulți și cățelelor pentru tratamentul și prevenirea bolilor parazitare asociate cauzate de purici, căpușe ixodide, păduchi, scabie și acarieni trombidiformi, nematode și cestode, pentru prevenirea dirofilariozei cauzate de larve. *Dirofilaria immitis* și *Dirofilaria repens*, precum și reducerea riscului de infecție cu boli transmise de căpușe.

4. CONTRAINDICAȚII

Contraindicații pentru utilizarea Express Tabs este sensibilitatea individuală crescută a animalului la componentele medicamentului (inclusiv în anamneză), epuizare, boli infecțioase, epilepsie, hipertermie, disfuncție hepatică și renală. Nu se recomandă utilizarea medicamentului la animale din alte specii, precum și la câini cu greutatea mai mică de 1,25 kg, cățele în timpul gestației și alăptării, căței cu vârsta sub 8 săptămâni. Medicamentul nu trebuie utilizat la rasele de câini sensibile la lactone macrociclice, inclusiv Ciobănescul Australian (Aussie), Ciobănesc Alb, Bobtail (câine ciobănesc englezesc vechi), Border Colli, Colli cu păr scurt, Colli cu păr lung, Macnab, Whippet cu părul lung, Windhound, Shelti și metișii acestora, precum și câini cu sensibilitate crescută determinată genetic (deficiență MDR1).

5. REACȚII ADVERSE

După utilizarea Express Tabs, pot apărea reacții adverse: frecvente (la mai mult de 1, dar mai puțin de 10 din 100 de animale) - hipersalivație, vomă, diaree, refuz de a mânca, depresie, ataxie, tremor muscular, midriază (dilatare pupilelor), excitabilitate nervoasă, fotofobie; foarte rare (la mai puțin de 1 din 10.000 de animale) sunt posibile convulsii. Aceste simptome dispar de obicei spontan, nu necesită utilizarea de

medicamente și nu se observă la utilizare repetată. În cazul unei sensibilități individuale crescute a animalului la componentele medicamentului și/sau la tratarea unui animal cu microfilaremie pronunțată, se prescriu antihistaminice și terapie simptomatică.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Express Tabs se administrează animalelor individual, o singură dată, pe cale orală (în interior) cu o cantitate mică de hrană (recompensă) în timpul hrănirii sau la rădăcina limbii imediat după hrănire. **Doza terapeutică** (pe ingrediente active) a preparatului **pentru 1 kg masă corporală** este: **30 mg spinosad + 5 mg praziquantel + 0,2 mg moxidectină**. Dozele de Express Tabs în funcție de greutatea animalului, modificarea și ambalajul comprimatelor utilizate sunt prezentate în tabel:

Masa corporală (m/c) kg	Ambalajul preparatului			
	Câini cu masa corporală până la 5 kg	Câini cu masa corporală de la 5 la 10 kg	Câini cu masa corporală de la 15 la 30 kg	Câini cu masa corporală de la 30 la 60 kg
	Specificarea preparatului (numărul de pastile, buc.)			
	Pentru câini cu m/c 5 kg (1 pastilă la 5 kg m/c)	Pentru câini cu m/c 10 kg (1 pastilă la 10 kg m/c)	Pentru câini cu m/c 30 kg (1 pastilă la 30 kg m/c)	
1,25 - 2	¹ / ₄ (o pătrime) pastilă			
2,1 - 3	¹ / ₂ (jumătate) pastilă			
4 -5	1 pastilă	¹ / ₂ o jumătate de pastilă		

6 - 8	1 pastilă + ¹ /2 (jumătate pastilă)	¹ /2 (o jumătate) pastilă + și o pătrime pastilă		
9 - 10	2 pastile	1 pastilă		
14		1 pastilă + ¹ /4 (o pătrime) din pastilă		
15		1 pastilă + ¹ /2 (o doime) din pastilă	¹ /2 (o jumătate) din pastilă	
16 - 20		2 pastile	¹ /2 (o jumătate) din pastilă + și (o pătrime) din pastilă	
21 -25		2 pastile + ¹ /2 (o jumătate) de pastilă		
26 - 30			1 pastilă	
31 - 40			1 pastilă + ¹ /4 (o pătrime) din pastilă	
41 -45			1 pastilă+ ¹ /2 (o doime) din pastilă	
46 - 60			2 pastile	
	Combinății de pastile cu masa corporală a câinilor			

Când se utilizează preparatul la câini cu o greutate mai mare de 60 kg, trebuie selectată o combinație de comprimate cu conținutul substanțelor active corespunzătoare. De exemplu: două comprimate „Pentru câini cu o greutate de 30 kg”, plus un număr suplimentar necesar de comprimate „Pentru câini cu o greutate de 10 kg”, în proporție de un comprimat pentru fiecare 10 kg suplimentar din greutatea corporală a animalului. Pentru a preveni posibilele reacții adverse la animalele sensibile, este permisă împărțirea dozei de medicament în două părți egale, cu administrare ulterioară la un interval de 3-5 ore. Este necesar să vă asigurați că animalul a înghițit întreaga doză necesară de Express Tabs. Când se

utilizează medicamentul cu alimente, este permisă zdrobirea comprimatelor. Când animalele sunt ținute în grupuri, se recomandă tratarea simultană a tuturor animalelor. Tratamentele repetate ale animalelor se efectuează la intervale de 6-8 săptămâni pe parcursul întregului sezon de activitate a ectoparaziților. Pentru a asigura un efect protector împotriva căpușelor ixodide, medicamentul trebuie administrat cu cel puțin 24 de ore înainte de plimbarea preconizată a animalelor în locurile în care pot trăi căpușe (parcuri, piețe, păduri). Pentru a preveni reinfestarea cu ectoparaziți, zonele de locuit ale animalului, așternutul și păturile sunt tratate cu un insecticid, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a acestuia. În caz de helmintoze a tractului gastrointestinal, deparazitarea repetată se efectuează conform indicațiilor, dar nu mai devreme de 1,5 luni (6 săptămâni) după acest tratament. În scopul prevenirii dirofilariozei în regiunile nefavorabile de boală, medicamentul se utilizează în perioada de zbor a țânțarilor, în perioada primăvară-vară-toamnă, începând utilizarea acestuia cu o lună înainte de începerea zborului țânțarilor, apoi la fiecare perioadă de toamnă, începând utilizarea sa cu o lună înainte de începerea zborului țânțarilor, apoi la fiecare 1,5 luni până la sfârșitul sezonului, ultimul tratament efectuându-se o dată pe lună după sfârșitul zborului insectelor. Tratamentul demodeciei, sarcoptozei și otodectozei se recomandă a fi efectuat în combinație cu utilizarea de medicamente simptomatice și patogenetice pentru terapie. În tratamentul formelor generalizate de boli, preparatul se administrează de 2-3 ori la intervale de 6 săptămâni până la recuperare confirmată de rezultatele studiilor acarologice.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură de la +2°C la + 25°C.

A se feri de lumină și a se păstra în loc uscat.

10.PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11.ATENȚIONĂRI SPECIALE

Pentru a preveni posibilele reacții adverse la animalele sensibile, este permisă împărțirea dozei de medicament în două părți egale, cu administrare ulterioară la un interval de 3-5 ore. Este necesar să vă asigurați că animalul a înghițit întreaga doză necesară de Express Tabs. Când se utilizează medicamentul cu alimente, este permisă zdrobirea comprimatelor. Când animalele sunt ținute în grupuri, se recomandă tratarea simultană a tuturor animalelor. Tratamentele repetate ale animalelor se efectuează la intervale de 6-8 săptămâni pe parcursul întregului sezon de activitate a ectoparaziților. Pentru a asigura un efect protector împotriva căpușelor ixodide, medicamentul trebuie administrat cu cel puțin 24 de ore înainte de plimbarea preconizată a animalelor în locurile în care pot trăi căpușe (parcuri, piețe, păduri). Pentru a preveni reinfestarea cu ectoparaziți, zonele de locuit ale animalului, așternutul și păturile sunt tratate cu un insecticid, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a acestuia. În caz de helmintoze a tractului gastrointestinal, se efectuează deparazitare repetată conform indicațiilor, dar nu mai devreme de 1,5 luni (6 săptămâni) după acest tratament. În scopul prevenirii dirofilariozei în regiunile nefavorabile de boală, preparatul se utilizează în perioada de zbor a țânțarilor, în perioada primăvară-vară-toamnă, începând utilizarea acestuia cu o lună înainte de începerea zborului țânțarilor, apoi la fiecare 1,5 luni. Înainte de sfârșitul sezonului, ultimul tratament se efectuează o dată pe lună după încheierea zborului insectelor.

12.PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 36 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Preparatul este ambalat în blistere a câte 1, 2 și 3 comprimate, ambalate individual într-o cutie de carton, împreună cu instrucțiunile de utilizare.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru