

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Brovadazol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.
OOO “Brovafarma”, Ucraina, or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Brovadazol – pulbere microgranulată pentru uz intern.

În 1 g conține:

- **Substanță activă:** fenbendazol - 50 mg
- **Adjuvanți:** excipienți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Dehelmintizarea individuală sau în grup a:

- Bovinelor,
- Ovinelor,
- Caprinelor,

- Porcinelor,
- Cabalinelor,
- Animalelor carnivore de blană,
- Găinilor,
- Gâștelor.

Afecțiuni tratate: Infestări cu nematode (forme mature și imature), unele cestode și trematode.

4. CONTRAINDICAȚII

- A nu se administra concomitent cu medicamente destinate tratării fasciolozei.
- Evitați administrarea timp de 7 zile după tratamente cu bromsalani.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea în doze terapeutice, conform instrucțiunilor, Brovadazol nu provoacă reacții adverse.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, animale carnivore de blană, găini, gâște.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Brovadazol se administrează animalelor o singură dată, dimineața, amestecat cu furajele concentrate, conform dozelor indicate în tabel.

Specia animalului și denumirea helmintozei	Doza (mg/kg masă corp)		
	Brovadazol	SA	Număr de administrări
Bovine			
Dictiocauloză, strongilatoză, strongiloidoză	200	10	O dată
Dicrocelioză	660	33	O dată
Cisticercoză	500	25	3 zile consecutive
Ovine , caprine:			
Invazie mixtă de nematode	300	15	O dată
Dictiocauloză	200	10	O dată
Moniezioză	200	10	O dată

Trihuroză	300	15	2 zile consecutive
Echinococoză, cenuroză	800	40	3 zile consecutive
Dicrocelioză	440	22	2 zile consecutive
Porcine			
Ascaroză	150	7,5	2 zile consecutive
Trihuroză	200	10	2 zile consecutive
Esofagostomoză și strongiloidoză	200	10	0 dată
Invazie mixtă Purcei de la 2 la 8 săptămâni șeptel de prăsilă	20	1	0 dată în săptămână
	150	7,5	2 ori pe zi
Cabaline			
Parascaridoză+strongilatoză	300	15	0 dată
Strongiloidoză (mânji de 1-2 luni)	160	8	2 zile consecutive
Carnasiere și animale de blană			
Invazie mixtă	300	16	0 dată
Găini: per cap			
Ascaridioză	100	5	2 zile consecutive
Ascaridioză + heterachidoză	200	10	0 dată
Gâște: per cap			
Invazie mixtă	800	40	0 dată

În cazul dehelmintizării în grup, cantitatea preparatului se mărește cu 5%.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

- Carcase bovine, ovine, caprine, porcine: 10 zile.
- Păsări: 3 zile.
- Subprodusele: se dau în consum uman peste 10 zile de la ultima administrare.
- Lapte: 2 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Acest medicament veterinar a fost prescris exclusiv pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l oferiți altor persoane, deoarece utilizarea incorectă poate provoca probleme.

Fiecare serie de preparat este testată preliminar pe un număr mic de animale, monitorizate timp de 24 de ore.

Dehelmintizarea în masă este permisă doar dacă nu se observă complicații sau reacții adverse la animalele testate.

Administrarea în grup necesită omogenizarea atentă și respectarea exactă a recomandărilor și dozajului (+5%).

12. PERIOADA DE VALABILITATE

3 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pachet din polimer de 10 g, 100 g și 1000 g.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru