

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

### Bars Spray

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**  
OOO "AVZ S-P", 141300, Rusia, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Țentralinaia 1

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

Bars spray insectoacaricid – soluție pentru uz extern.

Compoziție: 1 ml soluție conține:

- **Substanță activă:** fipronil – 3 mg.

**3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Bars spray insectoacaricid este indicat pentru câini, pisici, dihori, chinchile (șinșile), cobai, șobolani și hamsteri în tratamentul entomozelor (păduchi malofagi și hematofagi, purici), sarcoptoidozelor (sarcoptoza, notoedroză), heiletiozei și căpușelor ixodide, precum și în scop preventiv.

#### **4. CONTRAINDICAȚII**

- Este contraindicat animalelor de producție.
- Sensibilitate individuală crescută la componentele medicamentului.
- Animale afectate de boli infecțioase, epuizate sau aflate în perioadă de convalescență.

#### **5. REACȚII ADVERSE**

La utilizarea conform instrucțiunilor, nu apar reacții adverse sau complicații.

În caz de sensibilitate individuală crescută la componentele medicamentului și apariția complicațiilor (salivație, lăcrimare, vomă), administrarea se oprește, iar animalul se spală cu apă și șampon.

#### **6. SPECII ȚINTĂ**

Câini, pisici, dihori, chinchilla (șinșila), cobai, șobolani, hamsteri.

#### **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Doze:

Doza de spray insectoacaricid Bars pentru câini, pisici și dihori, în funcție de starea blănii, variază între 0,5 - 1,0 ml/kg masă corporală, ceea ce reprezintă 2 - 4 pulverizări din flaconul de 100 ml și 1 pulverizare (1,0 ml) din flaconul de 200 ml.

Rozătoarele afectate de ectoparaziți se tratează cu spray insectoacaricid Bars în următorul raport: hamsteri - 0,25 ml/animal, chinchilla (șinșila), cobai și șobolani - 0,25 ml/100 g masă corporală.

Pentru prevenirea reinfestării, așternutul și alte obiecte de îngrijire se tratează în raport de 2 ml/m<sup>2</sup>.

Mod de administrare:

Flaconul se agită bine și, ținându-l vertical, se pulverizează pe suprafața dorită de la o distanță de 25-30 cm. O apăsare pe difuzorul flaconului de 200 ml eliberează o doză de 1,0 ml, iar pentru flaconul de 100 ml - 0,25 ml.

Pentru eliminarea insectelor și combaterea atacului căpușelor ixodide, se tratează întreaga suprafață a corpului animalului, aplicând pe piele și umezind ușor blana (la animalele cu blană lungă, smocul se ridică cu mâna și se aplică la baza acestuia).

Pentru a preveni lingerea, animalului i se aplică o botniță. Protejând ochii animalului cu mâna, se tratează pavilionul urechilor și pieptul, masând ușor medicamentul cu vârful degetelor în jurul ochilor și nasului, apoi se continuă cu gâtul, corpul, membrele, abdomenul și coada.

După 20 de minute de la aplicare, blana se pieptănă, iar animalul se eliberează de botniță.

Pentru combaterea căpușelor ixodide de pe suprafața corpului animalului, medicamentul se aplică direct pe locul fixării acestora pe piele. Dacă în 20-30 de minute căpușa nu se desprinde, se extrage cu grijă și se distruge.

În scop preventiv, tratamentele se efectuează nu mai des de o dată pe lună împotriva insectelor și o dată la 14 zile împotriva căpușelor ixodide (pe durata sezonului de parazitare).

În caz de notoedroză la pisici și sarcoptoză la câini, medicamentul se aplică pe suprafața afectată, curățată de cruste, și pe 1 cm de țesut înconjurător. Aplicarea se face până la umezirea ușoară a zonei afectate, de 2-4 ori, la intervale de 7-10 zile, până la vindecarea animalului, confirmată prin două rezultate negative la examenul acarologic de laborator. Pentru animalele cu suprafețe afectate extinse, tratamentul se realizează în două etape, la interval de 1 zi, aplicând întâi pe o parte a corpului, apoi pe cealaltă.

Până la uscarea completă a blănii, se evită lingerea și apropierea de surse electrice de încălzire sau flacăra deschisă. Animalele nu se spală cu șampon sau săpun timp de 3 zile înainte și 3 zile după tratament, nici nu se permit în bazine acvatice timp de 48 de ore după aplicare. O aplicare oferă protecție animalului împotriva insectelor timp de 1 lună și împotriva căpușelor ixodide timp de cel puțin 2 săptămâni.

## **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

## **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

## **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

**Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:**

- Nu se aplică tratament cățeilor și dihorilor cu vârsta sub 10 săptămâni, nici rozătoarelor sub 2 săptămâni.
- La animalele cu blană lungă, smocul se ține cu mâna în timp ce soluția se aplică la baza acestuia.

#### **Precauții speciale pentru utilizarea la animale:**

- Pentru a preveni ingerarea, se aplică o botniță. Până la uscarea completă a blănii, se evită lingerea și apropierea de surse electrice de încălzire sau flacăra deschisă. Animalele nu se spală cu șampon sau săpun timp de 3 zile înainte și 3 zile după tratament și nu se permit în bazine acvatice timp de 48 de ore după aplicare.
- Pentru prevenirea reinfestării, așternutul și alte obiecte de îngrijire se tratează cu spray în raport de 2 ml/m<sup>2</sup>. Timp de 3 zile, contactul animalului cu suprafețele tratate nu este permis, iar înainte de utilizarea ulterioară, acestea se spală cu detergent.

#### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:**

- Toate manipulările cu spray-ul insectoacaricid Bars se efectuează utilizând mănuși de cauciuc și mască respiratorie.
- Este important să se respecte regulile generale de igienă personală și normele de siguranță prevăzute pentru lucrul cu medicamente de uz veterinar. Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului li se recomandă să evite contactul direct cu spray-ul insectoacaricid Bars. În caz de contact accidental cu pielea, se șterge imediat cu un tampon; în cazul contactului cu mucoasele oftalmice, acestea se spală abundent cu apă. În caz de reacție alergică sau ingerare, este esențial să se solicite cât mai rapid asistență medicală (având la îndemână eticheta sau prospectul). În timpul utilizării, este interzis fumatul, consumul de alimente și băuturi. La finalizarea manipulării, mâinile se spală cu apă și săpun. Timp de 24 de ore după tratament, contactul animalului cu copiii nu este permis.

#### **Utilizarea în perioada de gestație și lactație:**

- Nu se administrează femelelor gestante și în lactație.

#### **Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:**

- Nu se administrează concomitent cu alte medicamente insectoacaricide.

**Supradozaj:**

- Salivație abundentă, tremor muscular, vomă. În astfel de cazuri, medicamentul se spală de pe suprafața corpului, iar animalului i se administrează terapie simptomatică.

**12.PERIOADA DE VALABILITATE**

2 ani din data produceri.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

**13.STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

**14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Flacon din polimer cu difuzor, a câte 100 și 200 ml.

**15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)