

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

**FYPRYST 67 mg soluție spot-on pentru câini**  
**FYPRYST 134 mg soluție spot-on pentru câini**  
**FYPRYST 268 mg soluție spot-on pentru câini**  
**FYPRYST 402 mg soluție spot-on pentru câini**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

**1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

KRKA, d.d., Smarješka cesta 6, 8501 Novo Mesto  
Slovenia

**2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

FYPRYST 67 mg soluție spot-on pentru câini

FYPRYST 134 mg soluție spot-on pentru câini

FYPRYST 268 mg soluție spot-on pentru câini

FYPRYST 402 mg soluție spot-on pentru câini

**1 pipetă (0,67 ml) conține:**

- Substanță activă: Fipronil 67 mg
- Excipienți:
  - Butilhidroxitoluen (E320) - 0,134 mg
  - Butilhidroxitoluen (E321) - 0,067 mg

**1 pipetă (1,34 ml) conține:**

- Substanță activă: Fipronil 134 mg
- Excipienți:
  - Butilhidroxitoluen (E320) - 0,27 mg
  - Butilhidroxitoluen (E321) - 0,13 mg

**1 pipetă (2,68 ml) conține:**

- Substanță activă: Fipronil 268 mg
- Excipienți:
  - Butilhidroxitoluen (E320) - 0,54 mg
  - Butilhidroxitoluen (E321) - 0,27 mg

**1 pipetă (4,02 ml) conține:**

- Substanță activă: Fipronil 402 mg
- Excipienți:
  - Butilhidroxitoluen (E320) - 0,80 mg
  - Butilhidroxitoluen (E321) - 0,40 mg

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

- Tratamentul și prevenirea infestațiilor cu purici (*Ctenocephalides spp.*) și căpușe (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*) la câini.
- Tratamentul și controlul dermatitelor alergice cauzate de înțepăturile puricilor (FAD) la câini.
- Prevenirea și tratamentul infestațiilor cu păduchi malofagi (*Trichodectes canis*) la câini.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

- Produsul nu se administrează căteilor cu vârsta mai mică de 8 săptămâni sau cu greutatea mai mică de 2 kg, datorită datelor insuficiente.
- Nu se administrează animalelor bolnave (cu boli sistemice, febră) sau celor aflate în convalescență.

- Nu se administrează produsul la iepuri, datorită riscului de reacții adverse grave sau chiar deces.
- Produsul este destinat exclusiv câinilor. Nu administrați la pisici, deoarece poate duce la supradozaj.

## **5. REACȚII ADVERSE**

- În cazul în care animalele se ling, poate apărea hipersalivație de scurtă durată, cauzată de excipienți.
- Reacții adverse extrem de rare pot include reacții pasagere ale pielii la locul aplicării (decolorare, căderea părului, prurit și eritem), prurit general cu alopecie.
- În cazuri excepționale, pot apărea simptome neurologice reversibile (hiperestezie, depresie, nervozitate), hipersalivație, vomă sau simptome respiratorii.
- Evitați supradozarea.

## **6. SPECII ȚINTĂ**

Câini.

## **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

Cantități de administrat:

- 0,67 ml soluție spot-on pentru câini cu greutate între 2 kg și 10 kg.
- 1,34 ml soluție spot-on pentru câini cu greutate între 10 kg și 20 kg.
- 2,68 ml soluție spot-on pentru câini cu greutate între 20 kg și 40 kg.
- 4,02 ml soluție spot-on pentru câini cu greutate peste 40 kg.
- 4,02 ml soluție spot-on + o pipetă corespunzătoare dozei pentru câini cu greutate peste 60 kg.

Doza minimă recomandată de fipronil este 6,7 mg/kg.

Interval minim între aplicări: 4 săptămâni.

Recomandări:

- Tratamentul lunar este recomandat pentru câinii cu risc crescut de infestații repetate cu purici sau căpușe, câini alergici la înțepăturile de purici, sau pentru câinii care fac băi frecvente cu șampoane hipoalergenice sau emoliente.
- În zonele cu risc scăzut de infestații, tratamentele pot fi administrate la fiecare două sau trei luni.

Metoda de administrare:

1. Scoateți o pipetă din ambalaj.
2. Țineți pipeta vertical, cu vârful în sus, și deschideți capacul.
3. Cu capătul dopului îndepărtat, perforați sigiliul pipetei.
4. Îndepărtați blana animalului de pe linia mediană dintre spete pentru a expune pielea.
5. Aplicați soluția direct pe piele, presând pipeta de mai multe ori pentru a o goli complet.

Produsul este eficient împotriva infestațiilor cu purici timp de 2 luni și împotriva căpușelor până la 4 săptămâni, în funcție de gradul de infestare al mediului înconjurător. Puricii sunt eliminați în 24 de ore de la aplicare.

#### **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

#### **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

#### **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșerte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

#### **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Produsul poate cauza iritarea membranelor mucoase și a ochilor. De aceea, evitați contactul produsului cu gura și ochii. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fipronil sau alcool trebuie să evite intrarea în contact cu produsul. Evitați contactul direct al mâinilor cu produsul. În caz de contact accidental, spălați mâinile cu apă și săpun.

În caz de contact accidental cu ochii, spălați din abundență cu apă curată. Spălați mâinile după utilizare. Nu puneți mâna pe animalele tratate și nu lăsați copiii să se joace cu acestea, până ce locul de aplicare a produsului nu s-a uscat. Astfel, nu se recomandă aplicarea tratamentului în timpul zilei, ci seara înainte de culcare, iar animalelor nu li se va permite să doarmă cu proprietarii și, mai ales, cu copiii.

Nu fumați, nu beți și nu mâncați în timp ce aplicați produsul.

## **12.PERIOADA DE VALABILITATE**

3 ani din data producerii, de la prima deschidere – a se folosi imediat.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

## **13.STATUT LEGAL**

Se eliberează fără prescripție veterinară.

## **14.NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Pipetă de 0,67 ml cu doză unică de soluție spot-on, împachetată în pungă triplă.

Pipetă de 1,34 ml cu doză unică de soluție spot-on, împachetată în pungă triplă.

Pipetă de 2,68 ml cu doză unică de soluție spot-on, împachetată în pungă triplă.

Pipetă de 4,02 ml cu doză unică de soluție spot-on, împachetată în pungă triplă.

Cutii cu 1, 3, 6, 10 și 20 pipete.

\*Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

## **15.DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**

SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; [zoofarmagro@mail.ru](mailto:zoofarmagro@mail.ru)