

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Murin Facoum Pasta

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

MURIN FACOUM PASTA

Momeală rodenticidă sub formă de pastă

CATEGORIE DE UTILIZATORI: Profesionali

LOC DE UTILIZARE: Interior și exterior

Compoziție

100 g de produs conțin:

- Brodifacum (CAS 56073-10-0; CE 259-980-5) – 0,005 g
- Benzoat de denatoniu (CAS 3734-33-6; CE 223-095-2) – 0,001 g
- Coformulanți și substanțe atractive – până la 100 g

PERICOL

Fraze de pericol:

- H360D: Poate dăuna fătului.
- H373: Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.

Fraze de precauție:

- P201: Citiți instrucțiunile speciale înainte de utilizare.
- P202: A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
- P280: Purtați mănuși de protecție.
- P308+P313: ÎN CAZ DE expunere sau posibilă expunere: Consultați medicul.
- P501: Eliminați conținutul și recipientul în conformitate cu normele naționale.

PRODUS BIOCID (TP14)

Autorizare Sanitară de Stat Nr. 00315

Titularul autorizației și unitatea de producție:

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL

Via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD), Italia

Tel. +39 049 9337111, www.vebi.it

Distribuit de:

Zoofarmagro SRL

Str. Căminului 4A, MD-2001 Chișinău, Republica Moldova

Tel. +373 22 855073, email: zoofarmagro@mail.ru

Prezentare:

- Momeli sub formă de pastă: 10 g, 12,5 g, 15 g; plicuri de 100 g, 200 g, 250 g, 500 g în ambalaj secundar – cutie de carton de 1,5 kg, 3 kg, 5 kg (ex. 15 plicuri de 100 g în cutie de 1,5 kg sau 6 plicuri de 500 g în cutie de 3 kg).
- Plicuri: 200 g, 250 g, 300 g, 500 g, 1 kg, 1,5 kg.
- Găleți: 2,5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg.
- Cutii de carton: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg.
- Recipiente de plastic monodoză: 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 75 g, 80 g, 100 g; cutii de carton: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg.

Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricației

Lot nr./Data fabricației: XXX

INFORMAȚII PENTRU MEDIC / INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR / EFECTE SECUNDARE POSIBILE

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Simptomele în caz de ingestie, care pot apărea cu întârziere, includ sângerări nazale sau gingivale. În cazuri grave, pot apărea hematoame și sânge în fecale sau urină.

Antidot: Vitamina K1, administrată doar de personal medical/veterinar.

În caz de:

- **Expunere a pielii:** Spălați pielea cu apă, apoi cu săpun și apă.
- **Expunere a ochilor:** Clătiți ochii cu apă sau soluție pentru spălarea ochilor, ținând pleoapele deschise timp de minim 10 minute.
- **Expunere orală:** Clătiți gura cu apă. Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Nu provocați voma.

În caz de ingerare, contactați imediat un medic și prezentați recipientul sau eticheta produsului. Dacă un animal de companie a ingerat produsul, consultați un medic veterinar.

CARACTERISTICI TEHNICE

MURIN FACOUM PASTA este o momeală rodenticidă gata de utilizare, bazată pe Brodifacum, eficientă împotriva șoarecilor și șobolanilor chiar și după o singură ingestie. Sub formă de pastă moale, grasă, dar neunsuroasă, formula este îmbogățită cu ingrediente speciale (semințe de floarea-soarelui și cânepă), fiind concepută pentru a maximiza eficiența împotriva speciilor de rozătoare menționate, chiar și în prezența altor surse de hrană.

Produsul nu alertează și nu trezește suspiciuni în rândul populației de rozătoare. Conține o substanță amară pentru a preveni ingerarea accidentală de către copii.

MURIN FACOUM PASTA poate fi utilizat în interiorul și în jurul clădirilor industriale (depozite, magazine, stive de marfă pe nave), rurale, civile, locuințe, pivnițe, garaje, camere, grădini și zone adiacente.

SPECII ȚINTĂ

- Șoarecele de casă (*Mus musculus*), exemplare tinere și adulți
- Șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*), exemplare tinere și adulți
- Șobolanul negru (*Rattus rattus*), exemplare tinere și adulți

MODALITĂȚI DE APLICARE

MURIN FACOUM PASTA este o momeală gata de utilizare, sub formă de pastă proaspătă, care trebuie plasată exclusiv în recipiente pentru momeală (stații de intoxicare) inviolabile, marcate corespunzător și protejate împotriva agenților atmosferici, ingerării accidentale de către specii nevizate și dispersării în mediu.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI AVERTIZĂRI

- Citiți și respectați instrucțiunile de pe ambalaj și informațiile furnizate la punctul de vânzare înainte de utilizare.
- Inspectați zona infestată și evaluați speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și amploarea infestării.
- Îndepărtați sursele de hrană accesibile rozătoarelor (ex. cereale vărsate, resturi alimentare). Nu curățați zona înainte de tratament, pentru a nu deranja rozătoarele și a facilita acceptarea momelii.
- Utilizați produsul doar în cadrul unui sistem integrat de management al dăunătorilor (IPM), incluzând măsuri de igienă și, dacă este posibil, metode fizice de control.
- Aplicați măsuri preventive (ex. astuparea găurilor, eliminarea surselor de hrană și apă) pentru a controla consumul și a preveni reinfestarea.
- Amplasați recipientele cu momeală în apropierea zonelor cu activitate a rozătoarelor (ex. trasee, cuiburi, garduri, vizuini).
- Dacă este posibil, fixați recipientele pe sol sau alte structuri.
- Etichetați clar recipientele, indicând că acestea conțin rodenticide și nu trebuie mutate sau deschise.
- În spații publice, semnalizați zonele tratate pe durata aplicării, indicând riscul de otrăvire primară/secundară și măsurile de prim ajutor.
- Asigurați momeala astfel încât să nu poată fi scoasă din recipient.
- Evitați plasarea produsului la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie sau de fermă.
- Țineți produsul departe de alimente, băuturi, furaje și suprafețe de contact.
- Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (UNI EN 374) în timpul manipulării.
- Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării. Spălați mâinile și pielea expusă după aplicare.
- Dacă consumul de momeală este redus comparativ cu infestarea, re poziționați recipientele sau schimbați tipul de momeală.
- Dacă după 35 de zile de tratament rozătoarele sunt încă active, identificați cauza (ex. rezistență) și considerați rodenticide non-anticoagulante, anticoagulante mai eficiente sau capcane.
- Etichetați recipientele cu: „A nu se deplasa sau deschide”; „Conține un rodenticid”; „MURIN FACOUM PASTA sau autorizația nr.”; „Substanța activă”; „În caz de incident, sunați la 112”.
- Nu deschideți plicurile interioare.
- Periculos pentru fauna sălbatică.

DOZARE ȘI METODE DE UTILIZARE

- Așezați MURIN FACOUM PASTA în recipiente adecvate. Inspectați periodic recipientele pentru a verifica integritatea, consumul și a elimina cadavrele. Completați momeala dacă este necesar.
- Protejați momeala de intemperii (ex. ploaie, zăpadă) și evitați zonele inundabile.
- Înlocuiți momeala deteriorată de apă sau murdărie.
- Respectați bunele practici relevante.

Utilizare în interior și exterior pentru șoarecele de casă (*Mus musculus*):

- Amplasați până la 50 g în fiecare recipient. Distanța dintre recipiente: ~5 m (2 m în infestații masive).
- Inspectați la fiecare 2-3 zile inițial, apoi săptămânal.

Utilizare în interior și exterior pentru șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*):

- Amplasați până la 200 g în fiecare recipient. Distanța dintre recipiente: ~10 m (5 m în infestații masive).
- Inspectați la fiecare 5-7 zile inițial, apoi săptămânal.

Utilizare în interior pentru șobolanul negru (*Rattus rattus*):

- Amplasați până la 200 g în fiecare recipient. Distanța dintre recipiente: ~10 m (5 m în infestații masive).
- Inspectați la fiecare 5-7 zile inițial, apoi săptămânal.

MĂSURI DE REDUCERE A RISCURILOR

- Informați persoanele din zonă despre campania de deratizare, dacă este posibil.
- Căutați și eliminați rozătoarele moarte frecvent (min. de 2 ori/săptămână) pentru a reduce riscul de otrăvire secundară.
- Evitați contactul momelii cu apele de suprafață sau sistemele de drenaj.
- Nu utilizați produsul direct în vizuini.
- Nu aplicați mai mult de 35 de zile fără evaluarea infestării și eficienței.
- Nu folosiți anticoagulantul ca momeală permanentă sau pentru monitorizare.
- Produsul este destinat doar utilizatorilor profesioniști.
- Dacă după 35 de zile infestarea persistă, consultați furnizorul sau un serviciu de deratizare.
- Nu spălați recipientele cu apă între aplicări.
- Eliminați momeala neconsumată, ambalajul și cadavrele conform legislației.
- Depozitați la loc uscat, răcoros, bine ventilat, ferit de lumina soarelui, în ambalajul original, inaccesibil copiilor, păsărilor și animalelor.

ALTE INFORMAȚII

- Efectul anticoagulantelor apare în 4-10 zile de la ingerare.
- Rozătoarele pot transmite boli. Nu atingeți cadavrele cu mâinile goale; folosiți mănuși sau clești.
- Conține o substanță amară pentru siguranța copiilor.
- Ambalajul nu se reutilizează și nu se eliberează în mediu.