

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Otidez

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

AO "Agrobioprom", 105064, Rusia, or. Moscova, str. Kazakova 6/1
AO "Agrobioprom", 143985, reg. Moscova, Balașiha, ș. Poltevscoe 4

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Otidez - picături auriculare, denumirea internațională nepatentată: permetrină, dexametazonă, benzocaină, gentamicină, terbinafină.

1 ml de Otidez conține: permetrină - 0,3 mg, dexametazonă - 1 mg, benzocaină - 10 mg, gentamicină sulfat - 4 mg, terbinafină hidroclohid-10 mg și excipienți.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Otidez se indică în tratamentul otitelor acute și cronice, dermatitelor pavilionului urechii și a canalului auditiv de etiologie bacteriană, fungică sau parazitară, pentru ameliorarea stării alergice în regiunea urechii la câini, pisici, animale de blană și iepuri decorativi.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitatea individuală sporită la componentele preparatului (inclusiv în anamneză) și în cazul timpanului perforat. A nu se folosi concomitent cu alte medicamente auriculare cu efect insectoacaricid, antimicotic și antibacterian.

5. REACȚII ADVERSE

Reacții adverse și complicații la administrarea conform instrucțiunii date, nu apar. În caz de sensibilitate sporită și apariția reacției alergice, administrarea se stopează și se recurge la terapie simptomatică cu antihistaminice.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici, animale de blană.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înainte de folosire, flaconul cu preparatul Otidez se agită intens. Se igienizează urechea înlăturând crustele și curățînd canalul auditiv cu un tampon îmbibat cu preparat.

Cu scop curativ, în cazul otitelor cronice și acute de etiologie bacteriană, alergică sau fungică, se picură în ambele urechi, de 2 ori pe zi, timp de 5 - 10 zile în doze indicate în tabel:

Specia și greutatea animalului	Picături pentru o prelucrare
Câini de talie mică, pisici, iepuri decorativi și animale de blană sub 10 kg greutate corp	1 - 3
Câini de talie medie, 10-20 kg greutate corp	4
Câini de talie mare, > 20 kg greutate corp	5 - 6

În cazul otodectozei, se efectuează două prelucrări cu interval de 5 - 7 zile. La necesitate cura se repetă peste 14 zile. Medicamentul Otidez se picură în ambele urechi, chiar dacă afectată este doar una.

În cazul dermatitei pavilionului urechii și a canalului auditiv, OtidezR se aplică pe suprafața afectată cu un tampon îmbibat, de 2-3 ori pe zi (7 - 10 zile, dar nu mai mult de 14 zile). Se admite folosirea concomitentă cu preparate etiotope și patogenetice.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T°C + 8°C+25°C

A se proteja de lumină.

A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe etichetă după EXP.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Folosirea Otidez în perioada gestației sau lactației se permite sub supravegherea medicului veterinar.

A nu se admite nimerirea prepatului în ochi.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

În ambalaj închis al producătorului - 3 ani din data producerii.

După deschiderea ambalajului primar - 25 de zile.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din polimer a câte 15 ml cu picurător și capac filetat securizat.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chișinău, str.Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru