

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Dana Spot-On

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "Apicenna", 123242, or. Moscova, str. Drujinnikovskaia, 15, et. 5, c I, oficiu 532/5, TEL: 89626252752,
e.karbysheva@apicenna.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Dana Spot-On – soluție pentru uz extern.

Substanța activă:

Fipronil – 50 mg în 1 ml

Excipienți:

Dimetilsulfoxid

Butilhidroxitoluol

Acid citric

Polisorbat-80
Polivinilpirolidon
Limonen
Polietilenglicol-200.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Dana Spot-on se indică câinilor și pisicilor de la vârsta de 12 săptămâni în tratamentul și profilaxia entomozelor provocate de purici și păduchi malofagi și hematofagi; acarozelor provocate de căpușele sarcoptice, ixode și Demodex, animalelor de blană în tratamentul și profilaxia otodectozei.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitate individuală sporită a animalului la componentele preparatului (inclusiv în anamneză), animale bolnave de boli infecțioase și în perioada de convalescență, câini cu greutatea sub 2 kg, pisici sub 1 kg, tineret până la 12 săptămâni și animalele productive. Nu se admite administrarea auriculară (râie auriculară) în caz de timpan perforat.

5. REACȚII ADVERSE

La administrarea conform instrucțiunii, nu apar efecte secundare. În caz de hipersensibilitate individuală la componentele preparatului și apariția iritațiilor, prelucrarea se oprește, Dana Spot-on se spală de pe suprafața pielii cu apă și săpun și dacă este necesar, se indică terapie desensibilizantă.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Denumirea preparatului	Volumul de preparat per animal, ml	Număr de pipete și volumul nominal p/u 1 prelucrare
Dana Spot-On căței și câini 2 – 10 kg	1,5 ml	1 pipetă de 1,5 ml
Dana Spot-On căței și câini 10 – 20 kg	3 ml	2 pipete de 1,5 ml
Dana Spot-On căței și câini 20 – 40 kg	4,5 ml	3 pipete 1,5 ml

Dana Spot-On câini mai mari de 40 kg	6 ml	4 pipete de 1,5 ml
Dana Spot-On motănași și pisici	0,5 ml	1 pipetă de 0,5 ml
Dana Spot-On pisici	1,0 ml	1 pipetă de 1,0 ml

În tratamentul și profilaxia entomozelor, pentru combaterea căpușelor ixode, Dana Spot-on se aplică o dată pe pielea intactă și uscată, în locuri inaccesibile pentru lingere (pe gât, la baza craniului, între umeri), folosind pipeta de volum corespunzător. Prelucrările repetate în perioada de activitate maximă a paraziților se efectuează la necesitate, dar nu mai des de o dată pe lună. În cazul scaldărilor frecvente cu săpun sau șampon (mai mult de două ori pe lună), nu se aplică mai des de o dată la două săptămâni.

În scopuri preventive pentru noi invazii de purici, se schimbă așternuturile sau se prelucrează cu preparate insecticide conform instrucțiunilor.

Pentru combaterea căpușelor ixode pe corpul animalului, se aplică 1-2 picături de Dana Spot-on direct pe căpușă și locul fixării acesteia pe piele. Dacă în 20-30 de minute căpușa nu cade, se extrage atent și se nimicește.

În tratamentul otodectozei (râie auriculară) la câini, pisici și animale de blană, mai întâi se curăță canalul auditiv și pavilionul urechii de cruste și secreții, apoi se picură 3-5 picături de preparat în ambele urechi și se masează baza urechii. Prelucrările se efectuează de 2-3 ori cu interval de 5-7 zile, iar dacă este necesar, tratamentul se repetă.

Pentru sarcoptoză, notoedroză sau demodecoză, preparatul se aplică pe suprafața afectată, curățată de cruste, cu un tampon, dinspre periferie spre centru, cuprinzând 1 cm din țesutul limitrof. În cazuri severe, se recomandă terapie complexă cu preparate simptomatice. Prelucrările se efectuează de 3-5 ori cu interval de 7-10 zile, până la însănătoșirea animalului, confirmată prin două rezultate acarologice negative.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Zeo zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra la loc întunecos, separat de produse alimentare și furaje, la T°C 5°C + 25°C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizare la animale: Acțiunea acaricidă a fipronilului începe la mai mult de 24 de ore de la aplicare, de aceea prelucrarea se efectuează nu mai târziu de 1 zi înainte de plimbarea pe teritoriu infestat, eventual cu căpușe (parcuri, scuaruri, păduri). Pentru a evita lingerea preparatului de pe suprafața afectată, animalului i se îmbracă botniță sau guler de protecție, care se scoate la 15-20 de minute după prelucrare.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pipete din metalopolimer sau flacon din polimer cu picurător.

15. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL” Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru